

Calf Lyte Plus



**2 schepjes (90gr)
per 2 liter water (37°C)
of melk**



**1 zakje (90 g)
per 2 liter water (37°C)
of melk**

Variabele schema's zijn mogelijk omdat Calf Lyte Plus oplosbaar is in melk én in water

Toediening:

- ▶ Geef 2 liter van de oplossing 2 tot 3x per dag in combinatie met of ter vervanging van de melkgift

Aanbevolen gebruiksduur:

- ▶ 1 tot 7 dagen indien gecombineerd met normale melkgift
- ▶ 1 tot 3 dagen indien het als enige voedingsbron gegeven wordt, gevolgd door één dag combinatie van de normale voeding en Calf Lyte Plus

Samenstelling: Dextrose (60,5%), natriumacetaat (18,3%), natriumchloride, kaliumchloride, mononatriumfosfaat, dikaliumfosfaat, melkeiwit poeder (bevat lactoferrine 0,1%), gekarameliseerde suiker. Koolhydraatbron: Dextrose.

Additieven: Bewaarmiddelen, smaakstoffen: Glycine 90 400 mg/kg, binders, emulgatoren, vitamines en soortgelijke additieven.

Analytische bestanddelen: totaal suikers 60,5%, ruwe as 17,7%, ruw eiwit 12,0%, natrium 5,9%, chloride 2,8%, kalium 1,7%, ruw vet 0,5%, ruwe celstof 0,5%.

Energiewaarde: 326kcal/100g

Hypertone oplossing: 490 mOsm/L

Calf Lyte Plus

- **3 energiebronnen**


- ▶ Dextrose
- ▶ Glycine
- ▶ Acetaat

- **In melk of water oplosbaar**

- **Zeer smakelijk (vanillesmaak)**

- **Lactoferrine**

- ▶ Zorgt voor ondersteuning van de natuurlijke afweer
- ▶ Verminderde uitscheiding van colibacillen in de mest ^[2]



⁽¹⁾ Hoogste SID (strong ion difference) waarde vergeleken met andere producten op de markt op 1/6/2018

⁽²⁾ Giordano, Dotreppe, Hornick, Mainil, Istasse, and Dufrasne. 2007. La lactoferrine et le système lactoperoxydase en supplementation orale à des veaux nouveau-nés en prevention des diarrhees. 224; Still J., P. Delahaut, P. Coppe, & A. Perraudin. 1990. Treatment of induced enterotoxigenic colibacillosis (scours) in calves by the lactoperoxidase system and lactoferrin. Ann Rech Vet. 21:143-152.; Van Leeuwen, P., S.J. Oosting, J.M.V.M. Mouwen, and M.W.A. Verstegen. 2000. Effects of a lactoperoxidase system and lactoferrin, added to a milk replacer diet, on severity of diarrhoea, intestinal morphology and microbiology of digesta and faeces in young calves. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 83:15-23.

Calf Lyte Plus is een aanvullend diervoeder voor kalveren voor de stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.